



## CRITERIOS DE TRIAJE DE MANCHESTER MODIFICADO

\*Tomado del Modelo de Atención Integral de Salud MAIS, Lineamientos Operativos para la Implementación del MAIS, Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Salud

Pública, Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Acuerdo Ministerial 000005169,

### LISTADO A. LISTA DE CONDICION DE SALUD SEGÚN PRIORIDAD – PRIORIDAD I

Pacientes con alteración súbita y crítica del estado de salud, en riesgo inminente de muerte, y que requieren atención inmediata en la Sala de Reanimación – Shock Trauma.

#### 18. Signos vitales anormales:

##### Adulto

- Frecuencia Cardíaca < 50 x min.
- Frecuencia Cardíaca > 150 x min.
- Presión Arterial Sistólica < 90 mmHg.
- Presión Arterial Sistólica > 220 mmHg.
- Presión Arterial Diastólica > 110 mmHg ó 30 mmHg por encima de su basal.
- Frecuencia Respiratoria > 35 x min.
- Frecuencia Respiratoria < 10 x min.

##### Pediátrico – Lactante

- Frecuencia Cardíaca ≤ 60 x min.
- Frecuencia Cardíaca ≥ 200 x min.
- Presión Arterial Sistólica < 60 mmHg.
- Frecuencia Respiratoria ≥ a 60 x min. (hasta los 2 meses).
- Frecuencia Respiratoria ≥ a 50 x min (desde los 2 meses al año)
- Saturación de oxígeno ≤ a 85%.

##### Pediátrico - Pre Escolar

- Frecuencia Cardíaca ≤ 60 x min.
- Frecuencia Cardíaca ≥ 180 x min.
- Presión Arterial Sistólica < 80 mmHg.
- Frecuencia Respiratoria > a 40 x min. (sin fiebre).
- Saturación de oxígeno ≤ a 85%.

1. Paro Cardiorespiratorio.
2. Dolor Torácico Precordial de posible origen cardiogénico con o sin hipotensión.
3. Dificultad respiratoria (evidenciada por polipnea, taquipnea, tiraje, sibilantes, estridor, cianosis)
4. Infarto agudo de miocardio
5. Shock (Hemorrágico, cardiogénico, distributivo, obstructivo)
6. Arritmia con compromiso hemodinámico de posible origen cardiogénico con o sin hipotensión.
7. Hemorragia profusa.
8. Obstrucción de vía respiratoria alta.
9. Neumotórax a tensión Inestabilidad
10. Urgencias y emergencias hipertensivas
11. Alteración del estado de conciencia (escala de Glasgow 8 o menos)
12. Paciente con trauma severo como:

- Víctima de accidente de tránsito.
- Quemaduras con extensión mayor del 20%.
- Dos o más fracturas de huesos largos proximales.
- Lesiones en extremidades con compromiso neurovascular.
- Heridas de bala o arma blanca con penetración de cavidades.
- Sospecha de traumatismo vertebro medular.
- Amputación o herida amplia con sangrado no controlado
- Traumatismo encéfalo craneano.

13. Status Convulsivo.
14. Sobredosis de drogas o alcohol más depresión respiratoria.
15. Ingesta de órgano fosforados, ácidos, alcalis, otras intoxicaciones o envenenamientos.
16. Signos y síntomas de abdomen agudo con descompensación hemodinámica.
17. Signos y síntomas de embarazo ectópico roto.

19. Cambios en el estado mental: letargia, delirio, alucinaciones, llanto débil.
20. Suicidio frustrado.
21. Intento suicida.
22. Crisis de agitación psicomotora con conducta heteroagresiva.
23. Problemas específicos en pacientes pediátricos.
24. Intoxicaciones por ingesta o contacto.
25. Apnea paroxística.
26. Deshidratación con Shock: Llenado capilar mayor de tres segundos.
27. Sangrado: Hematemesis, sangrado rectal, vaginal, epistaxis severa.



## INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS



28. Quemaduras en cara con afectación de la vía aérea
29. Quemaduras graves de más de 30 % de superficie corporal total.
30. Quemaduras por fuego de ambiente cerrado.
31. Acontecimiento de aspiración u obstrucción con cuerpo extraño.
32. Status asmático.
33. Hipertermia maligna.
34. Trastornos de sensorio.
35. Politraumatismo.
36. Cualquier otro caso que amerite atención inmediata en la Sala de Reanimación.



## LISTADO B. LISTA DE CONDICIÓN DE SALUD SEGÚN PRIORIDAD – PRIORIDAD II

Pacientes portadores de cuadro súbito, agudo con riesgo de muerte o complicaciones serias, cuya atención debe realizar en un tiempo de espera no mayor o igual de 10 minutos desde su ingreso, serán atendidos en Consultorios de Emergencia

Frecuencia respiratoria  $\geq$  de 24 por minuto.

1. Crisis asmática con broncoespasmo moderado.
2. Diabetes Mellitus descompensada (hipoglucemia moderada o severa, estado hiperosmolar no cetónico, cetoacidosis)
3. Hemoptisis.
4. Dolor Abdominal con signos y síntomas de Abdomen Agudo.
5. Convulsión reciente en paciente consciente.
6. Síndromes Confusionales
7. Dolor torácico no cardiogénico (dolor pleurítico o traumático), sin compromiso hemodinámico.
8. Arritmias, de nueva aparición, arritmias preexistentes descompensadas sin compromiso hemodinámico
9. Sangrado gastrointestinal, con signos vitales estables.
10. Paciente con trastornos en el sensorio. (amaurosis, ceguera, hipoacusia, sordera súbita de apareamiento agudo)
11. Hipotonía, flacidez muscular aguda y de evolución progresiva.
12. Descompensación Hepática.
13. Hernia umbilical o inguinal incarcerada.
14. Signos y síntomas de descompensación tiroidea.
15. Fracturas expuestas o múltiples, o con inestabilidad que pongan en riesgo la vida del paciente.
16. Herida amplia o en región especial con sangrado activo o exposición de estructuras neurovasculares, óseas u otras que requiere sutura inmediata
17. Trauma ocular grave (perforación, laceración, avulsión) o desprendimiento de retina
18. Síndrome febril o infección en paciente inmunocomprometido
19. Pacientes posts operados de cirugía altamente especializada o pacientes en programa de hemodiálisis, con síntomas y signos agudos
20. Coagulopatía sin descompensación hemodinámica
21. Cefalea con antecedentes de trauma craneal.
22. Síndrome Meníngeo.
23. Síntomas y signos de enfermedades vasculares agudas.
24. Alteraciones en diálisis/ descompensación del paciente insuficiencia renal.
25. Agresión sexual.
26. Cuerpos extraños en esófago tráquea y estómago con riesgo para la vida.
27. Pacientes con crisis de ansiedad / pánico
28. Cuadro de demencia con conducta psicótica.
29. Infecciones graves (estado séptico)
30. Herpes Zoster ocular.
31. Problemas específicos en pacientes Obstétricas:
  - Hemorragia de cualquier trimestre del embarazo.
  - Aborto provocado no terapéutico o intento fallido de aborto.
  - Amenaza de parto pretérmino
  - Gestante de 2º y 3º trimestre que reporta ausencia de movimiento fetales.
  - Sangrado post-parto.
  - Preeclampsia con signos de alerta, eclampsia Sd. HELLP
  - Sufrimiento fetal agudo.
  - Bradicardia (menor de 120 x min.) y taquicardia (> de 160 x min.) Fetal.
  - Traumatismo Abdominal.
  - Deshidratación por hiperémesis.
  - Cefalea (moderada a grave) asociada a epigastralgia.
  - Edema Generalizado.
32. Problemas Específicos en pacientes Pediátricos.
  - Sepsis en pacientes con prematuridad/bajo peso
  - Niños con fiebre y petequias o púrpura
  - Convulsiones de reciente apareamiento, síncope o mareos.
  - Cefalea/epistaxis no controlada.

## **INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS**

- Quemadura en región especial o en al menos 10% de área corporal.
- Trauma ocular.
- Laceración que requiere sutura con sangrado activo.
- Niños que han sufrido agresión física.

Cualquier otro caso que amerite atención inmediata en emergencia y que afecte la condición de salud del paciente.