

ANEXO 1
LISTADO DE PRIORIDADES SISTEMA DE TRIAGE MANCHESTER MTS® MODIFICADO

LISTADO A.
LISTA DE CONDICIÓN DE SALUD SEGÚN PRIORIDAD I- TRIAGE MANCHESTER MTS® MODIFICADO

Pacientes con alteración súbita y crítica del estado de salud, en riesgo inminente de muerte, y que requieren atención inmediata en la unidad de choque y reanimación:

1. Paro cardiorrespiratorio.
2. Dolor torácico precordial de posible origen cardiogénico con o sin hipotensión.
3. Dificultad respiratoria (evidenciada por polipnea, taquipnea, tiraje, sibilantes, estridor, cianosis).
4. Infarto agudo de miocardio.
5. Shock (hemorrágico, cardiogénico, distributivo, obstructivo).
6. Arritmia con compromiso hemodinámico de posible origen cardiogénico con o sin hipotensión.
7. Hemorragia profusa.
8. Obstrucción de vía respiratoria alta.
9. Neumotórax a tensión.
10. Urgencias y emergencias hipertensivas.
11. Alteración del estado de conciencia (escala de Glasgow 8 o menos).
12. Paciente con trauma severo como:
 - Víctima de accidente de tránsito.
 - Quemaduras con extensión mayor del 20% de la superficie corporal total.
 - Dos o más fracturas de huesos largos proximales.
 - Lesiones en extremidades con compromiso neurovascular.
 - Herida de bala o arma blanca con penetración de cavidades.
 - Sospecha de traumatismo vertebro medular.
 - Evisceración.
 - Amputación o herida amplia con sangrado no controlado.
 - Traumatismo encéfalo craneano.
13. Status convulsivo.
14. Sobredosis de drogas o alcohol más depresión respiratoria.
15. Ingesta de órganos fosforados, ácidos, álcalis, otras intoxicaciones o envenenamientos.
16. Signos y síntomas de abdomen agudo con descompensación hemodinámica.
17. Signos y síntomas de embarazo ectópico accidentado.
18. Signos vitales anormales:
 - **Adulto**
 - Frecuencia cardíaca < 50 x min.
 - Frecuencia cardíaca > 150 x min.
 - Presión arterial sistólica < 90 mm Hg.
 - Presión arterial sistólica > 220 mm Hg.
 - Presión arterial diastólica > 110 mm Hg o 30 mm Hg por encima de su basal.
 - Frecuencia respiratoria > 35 x min.

Ministerio de Salud Pública

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan
Código postal: 170146 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2-3814-400
www.salud.gob.ec

– Frecuencia respiratoria < 10 x min.

▪ **Pediátrico – Lactante**

- Frecuencia cardíaca \leq 60 x min.
- Frecuencia cardíaca \geq 200 x min.
- Presión arterial sistólica < 60 mm Hg.
- Frecuencia respiratoria \geq a 60 x min. (Hasta los 2 meses de edad).
- Frecuencia respiratoria \geq a 50 x min (Desde los 2 meses al año de edad)
- Saturación de oxígeno \leq a 85%.

▪ **Pediátrico - Pre escolar**

- Frecuencia cardíaca \leq 60 x min.
- Frecuencia cardíaca \geq 180 x min.
- Presión Arterial Sistólica < 80 mm Hg.
- Frecuencia respiratoria > a 40 x min. (sin fiebre).
- Saturación de oxígeno \leq a 85%.

19. Cambios en el estado mental: letargia, delirio, alucinaciones, llanto débil.
20. Suicidio frustrado.
21. Intento suicida.
22. Crisis de agitación psicomotora con conducta heteroagresiva.
23. Intoxicaciones por ingesta o contacto.
24. Apnea paroxística.
25. Deshidratación con shock: llenado capilar mayor de tres segundos.
26. Sangrado severo: hematemesis, sangrado rectal, vaginal, epistaxis severa.
27. Quemaduras en cara con afectación de vía aérea.
28. Quemaduras graves de más de 30% de superficie corporal total.
29. Quemaduras por fuego en ambiente cerrado.
30. Aspiración u obstrucción con cuerpo extraño.
31. Status asmático.
32. Hipertermia maligna.
33. Politraumatismo.
34. Cualquier otro caso que amerite atención inmediata en la unidad de choque y reanimación.

LISTADO B.

**LISTA DE CONDICIÓN DE SALUD SEGÚN PRIORIDAD II - TRIAGE MANCHESTER MTS®
MODIFICADO**

Pacientes portadores de cuadro súbito, agudo con riesgo de muerte o complicaciones serias, cuya atención debe realizarse en un tiempo de espera no mayor o igual de 10 minutos desde su ingreso:

1. Crisis asmática con broncoespasmo moderado.
2. Diabetes mellitus descompensada. (hipoglicemia moderada o severa, estado hiperosmolar no cetótico, cetoacidosis).
3. Hemoptisis.

Ministerio de Salud Pública

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan
Código postal: 170146 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2-3814-400
www.salud.gob.ec

4. Dolor abdominal con signos y síntomas de abdomen agudo.
5. Convulsión reciente en paciente consciente.
6. Síndromes confusionales.
7. Dolor torácico no cardiogénico, (dolor pleurítico o traumático) con y sin compromiso hemodinámico.
8. Arritmias de nueva aparición, arritmias preexistentes descompensadas, sin compromiso hemodinámico.
9. Sangrado gastrointestinal activo, con signos vitales estables.
10. Paciente con trastornos en el sensorio (Amaurosis, ceguera, hipoacusia, sordera súbita de aparecimiento agudo).
11. Hipotonía, flacidez muscular aguda y de evolución progresiva.
12. Descompensación (insuficiencia aguda) hepática.
13. Hernias de pared abdominal, cuando presenten signos de encarcelación y sufrimiento intestinal.
14. Signos y síntomas de descompensación tiroidea (tormenta tiroidea).
15. Fracturas expuestas o múltiples, o con inestabilidad que ponga en riesgo la vida del paciente.
16. Herida amplia o en región especial, con sangrado activo o exposición de estructuras neuro vasculares, óseas u otras, que requiere sutura inmediata.
17. Trauma ocular grave (perforación, laceración, avulsión) o desprendimiento de retina.
18. Síndrome febril o infección en paciente inmunocomprometido.
19. Pacientes post-operados de cirugía altamente especializada o pacientes en programa de hemodiálisis, con síntomas y signos agudos.
20. Coagulopatía sin descompensación hemodinámica.
21. Cefalea con antecedentes de trauma craneal.
22. Síndrome meníngeo.
23. Síntomas y signos de trombosis / embolia vascular agudas.
24. Alteraciones en diálisis / descompensación del paciente insuficiente renal.
25. Agresión sexual.
26. Cuerpos extraños en esófago, tráquea y estómago, con riesgo para la vida.
27. Pacientes con crisis de ansiedad / pánico.
28. Cuadro de demencia con conducta psicótica.
29. Infecciones graves (estado séptico).
30. Herpes zoster ocular.
31. Problemas específicos en pacientes obstétricas:
 - a. Hemorragia de cualquier trimestre del embarazo.
 - b. Aborto provocado no terapéutico o intento fallido de aborto.
 - c. Amenaza de parto pre término.
 - d. Gestante de 2º y 3º trimestre que reporta ausencia de movimientos fetales.
 - e. Sangrado pos-parto.
 - f. Pre eclampsia con signos de alerta, eclampsia, Síndrome HELLP.
 - g. Sufrimiento fetal agudo.
 - h. Trauma abdominal.
 - i. Deshidratación por hiperémesis.
 - j. Cefalea (moderada a grave) asociado a epigastralgia.
 - k. Edema generalizado.

Ministerio de Salud Pública

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan
Código postal: 170146 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2-3814-400
www.salud.gob.ec

32. Problemas específicos en pacientes pediátricos:
- a. Sepsis en pacientes con prematurez / bajo peso.
 - b. Niños con fiebre y petequias o púrpura.
 - c. Convulsiones de reciente aparecimiento, síncope o mareos.
 - d. Cefalea / epistaxis no controlada.
 - e. Quemaduras en región especial o en al menos del 10% de área corporal.
 - f. Trauma ocular.
 - g. Laceración / herida con sangrado activo, que requiere sutura.
 - h. Niños que han sufrido agresión física.

Cualquier otro caso que amerite atención inmediata en emergencia y que afecte la condición de salud del paciente.

Ministerio de Salud Pública

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan
Código postal: 170146 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2-3814-400
www.salud.gob.ec